

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 6-7 ЛЕТ

FEATURES OF FEARS AT CHILDREN WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF THE SPEECH OF 6-7 YEARS

L. Syrvacheva
T. DettSEL

Annotation

This article discusses fears and anxieties at preschool children of 6-7 years of age with general underdevelopment of speech and normal speech. Peculiarities of all manifestations of childhood fears at preschool children with general underdevelopment of speech are examined.

Keywords: fear, general underdevelopment of speech, preschool children.

Сырвачева Лариса Анатольевна

К.псих.н., доцент,
Красноярский государственный
педагогический университет им.
В.П. Астафьева

Детцель Татьяна Юрьевна

Магистрант,
Красноярский государственный
педагогический университет им.
В.П. Астафьева

Аннотация

Рассматриваются вопросы изучения страхов у дошкольников 6-7-летнего возраста с общим недоразвитием речи и нормой речевого развития. Выявлены особенности проявления детских страхов у детей с ОНР.

Ключевые слова:

Страх, общее недоразвитие речи, дошкольники.

Страх является важной и наиболее опасной из всех эмоций. Понятие "страх" разрабатывалось многими зарубежными и отечественными исследователями (З. Фрейд, А. Ребер, И.П. Павлов, В.Даль, Р.Ф. Овчаров, Ю.А. Неймер, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.В. Юрчук) и в связи с этим имеет разные трактовки. По мнению Ю.Л. Неймер страх это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности [7].

Изучению феномена страха в детском возрасте посвящены работы З. Фрейда, А.Фрейд, С. Холл, Г.С. Салливен, А.И. Захарова, Л.И. Божович, К.С. Лебединской, И.В. Дубровиной и других ученых.

В последнее десятилетие отечественные психологи и психотерапевты: А.С. Спиваковская, А.И. Захаров, М.А. Панфилова, А.Я. Варга, Г.П. Лаврентьева, И.Е. Кулинцова, отмечают рост числа детей с разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью [2]. Однако, как показывает анализ психолого-педагогической литературы, исследований посвященных изучению страхов у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) недостаточно, не смотря на то, что на сегодняшний день дошкольники с недостатками речи составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития [3].

Одним из показателей эмоционального развития до-

школьников с речевыми нарушениями являются страхи [1]. По мнению В.Г. Колягиной, для детей с речевой патологией характерно наличие страхов, которые затрудняют коррекционную работу с ними, а сильные и длительные страхи приводят в дальнейшем к нарушению адаптации ребенка в школе и другим неблагоприятным последствиям [8].

В связи с выше сказанным в основу нашего исследования легло предположение о том, что страхи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II-III уровня и детей с нормой речевого развития будут отличаться в их проявлении и содержании.

Экспериментальное исследование проводилось на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения № 226 комбинированного вида, "Золотой ключик", Кировского района г. Красноярска. В исследовании приняли участие 30 дошкольников в возрасте от 6 до 7 лет: 15 детей с общим недоразвитием речи II-III уровня и 15 детей с нормой речевого развития.

Для изучения особенностей проявления страхов у детей с общим недоразвитием речи использовались следующие методики: "Страхи в домиках" [6]; тест "Сказка" автор Луиза Дюсс [4].

Целью методики "Страхи в домиках" является выявление и уточнение преобладающих видов страхов: страха

темноты, одиночества, смерти, медицинские страхи и т.д. Совокупные ответы ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. Все страхи делятся на несколько групп: медицинские страхи; страх физического ущерба; страх смерти; страх животных и сказочных персонажей; страх темноты и страшных снов; пространственные страхи; социальные страхи.

Результаты сравнительного анализа проявления страхов, у детей с общим недоразвитием речи и детей с нормой речевого развития по методике "Страхи в домиках" представлены на **рисунке 1**.

При сравнении результатов проявления страхов у детей с общим недоразвитием речи и детей с нормой речевого развития установлено:

- ◆ у дошкольников с ОНР медицинские страхи проявляются на 2% чаще, чем у детей с нормой речевого развития;
- ◆ у дошкольников с ОНР страх физического ущерба на 7% реже, чем у детей с нормой речевого развития;
- ◆ у дошкольников с ОНР страх смерти на 8% реже, чем у детей с нормой речевого развития;
- ◆ у дошкольников с ОНР страх животных и сказочных персонажей на 3 % чаще, чем у детей с нормой речевого развития;
- ◆ у детей с ОНР страх темноты и страшных снов на

7% чаще, чем у детей с нормой речевого развития;

- ◆ у детей с ОНР и нормой речевого развития пространственные страхи на одном уровне;
- ◆ у детей с ОНР социальные страхи на 3% чаще, чем у детей с нормой речевого развития.

Таким образом, исследование страхов по методике "Страхи в домиках" выявило, что у детей с общим недоразвитием речи чаще, чем у детей с нормой речевого развития преобладают: страх животных и сказочных персонажей, темноты и страшных снов, социальные и медицинские страхи, и реже встречаются страх физического ущерба и смерти.

Целью теста "Сказка" Луизы Дюссе является выявление наличия страхов или их отсутствие у детей. Тест состоит из десяти сказок, которые сближают общий фактор – персонаж, с которым ребенок будет себя идентифицировать. В зависимости от "расположения духа" ребенок реагирует на ситуацию, изложенную в сказке, спокойно или, наоборот, тревожно. Все сказки заканчиваются вопросительной фразой, ответ на которую должен дать ребенок. Наличие страхов говорит о том, что ребенок нуждается в помощи специалиста, отсутствие страхов, что ребенок психологически здоров.

Сравнительный анализ наличия или отсутствия страхов у детей с общим недоразвитием речи и нормой речевого развития по методике тест "Сказка" представлен на **рисунке 2**.

Группы страхов у детей с общим недоразвитием речи и нормой речевого развития




Рис. 1. Группы страхов у детей с общим недоразвитием речи и нормой речевого развития.

1-медицинские страхи; 2- страх физического ущерба; 3- страх смерти; 4-страх животных и сказочных персонажей; 5- страх темноты и страшных снов; 6- пространственные страхи; 7 -социальные страхи.



Рисунок 2. Сравнительный анализ наличия или отсутствия страхов у детей с общим недоразвитием речи и с нормой речевого развития.

Выявлено:

- ◆ дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают страх и нуждаются в помощи специалиста чаще на 6,7 %, по сравнению с детьми с нормой речевого развития;
- ◆ дошкольников с общим недоразвитием речи, которые не испытывают страх (психологически здоровые дети) реже на 6,7 % по сравнению с детьми с нормой речевого развития.

Таким образом, детям с общим недоразвитием речи помощь специалиста требуется на 6,7% чаще, чем детям с нормой речевого развития.

В результате экспериментального исследования выявлены следующие особенности проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: они чаще испытывают страх и нуждаются в помощи специалиста; у них чаще возникает страх животных, сказочных персонажей, темноты, страшных снов; чаще социальные и медицинские страхи, реже встречаются страх физического ущерба и смерти.

Знание особенностей проявления страхов у детей с общим недоразвитием речи позволил разработать комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленный как на преодоление выявленных страхов, так и на предупреждение их возникновения, что будет способствовать полноценному психическому развитию дошкольников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей.– СПб: 2005. – 320с.
2. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей. – М.: Педагогика, 2000. – 112 с.
3. Калягин В.А. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – 2–е изд., испр. – М.: Издательский центр "Академия", 2007. – 320 с.
4. Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультация, тренинг.– Изд. Академия Развития, 2001.– 160 с.
5. Кулинцева И.Е. "Коррекция детских страхов с помощью сказок" Т.Ц. СфераС-П.2008 – 167 с.
6. Панфилова М.А. Клинический психолог в работе с детьми различных патологий (с задержкой психического развития и с хроническими соматическими заболеваниями). [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 6. URL: <http://medpsy.ru>
7. Психологический словарь. / Под. ред. Ю.Л. Неймара. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 604 с.
8. Психологическое изучение страхов у дошкольников с речевыми нарушениями// Специальная психология.– 2008.– 3(17).–с. 13–15