

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ СОННЫХ АРТЕРИЙ ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

SPECIFIC FEATURES OF CAROTID ARTERY HEMODYNAMICS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH COMORBIDITIES

**O. Tanchenko
S. Naryshkina**

Summary. The article in hand reviews the study of patterns of carotid artery hemodynamics in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with comorbidities and abdominal obesity. It is interesting to note that in the case of COPD with comorbidities there is a more pronounced increase in the resistance index at the level of the internal and external carotid arteries. It has been established that the increase in the carotid intimal medial thickness of the common carotid arteries in patients with COPD with comorbidities and abdominal obesity is an independent risk factor for cardiovascular disasters and the progression of cardiovascular pathology. Early diagnostics and correction of changes in hemodynamics in the carotid arteries and metabolic disorders will allow timely prevention of adverse consequences of vascular complications of this comorbid pathology.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, atherosclerotic process, carotid arteries, abdominal obesity.

Танченко Ольга Анатольевна

*К.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Амурская государственная
медицинская академия» Минздрава России (город
Благовещенск)
tamaninao@gmail.com*

Нарышкина Светлана Владимировна

*Д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Амурская
государственная медицинская академия» Минздрава
России (город Благовещенск)*

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения особенностей состояния гемодинамики в сонных артериях при коморбидном течении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и абдоминального ожирения. Интересно отметить, что при коморбидном течении ХОБЛ наблюдается более выраженное повышение показателя индекса резистентности на уровне внутренних и наружных сонных артерий. Выявлено, что увеличение показателя толщины комплекса интима-медиа общих сонных артерий является при коморбидном течении ХОБЛ и абдоминального ожирения независимым фактором риска сердечно-сосудистых катастроф и прогрессирования кардиоваскулярной патологии. Ранняя диагностика и коррекция изменений гемодинамики в сонных артериях и метаболических нарушений позволит своевременно предотвратить неблагоприятные последствия сосудистых осложнений данной коморбидной патологии.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклеротический процесс, сонные артерии, абдоминальное ожирение.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — актуальная проблема современной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ занимает 4-е место среди причин смертности населения земного шара. Отмечается высокая распространенность ХОБЛ у лиц старше 50 лет [2, 4, 8, 9]. У больных с ХОБЛ наблюдается возрастание числа случаев смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, что позволяет предполагать о важной роли сосудистых катастроф в патогенезе фатальных обострений ХОБЛ [1, 3, 5]. Среди многочисленных сопутствующих заболеваний ХОБЛ на сегодняшний день рассматривается сердечно-сосудистая патология, абдоминальное ожирение и дислипидемия [6, 7, 11]. Увеличение распространенности случаев абдоминального ожирения среди больных ХОБЛ может быть связано с уменьшением физической активности, курением, снижением чувствительности к инсулину [4, 9, 10]. Изучение состояния гемодинамики магистральных сосудов при ХОБЛ, ассоциированной с абдоминальным ожирением позво-

лит совершенствовать методы профилактики и лечения осложнений данной нозологии.

Цель исследования

Изучить влияние компонентов абдоминального ожирения на изменения гемодинамики в сонных артериях у больных с ХОБЛ и оценить их взаимосвязь с инсулинорезистентностью, липидным спектром, антропометрическими данными.

Материалы и методы

В комплексное исследование включено 63 пациента в возрасте от 37 до 69 лет со среднетяжелой стадией ХОБЛ в сочетании с абдоминальным ожирением (1-я группа). Объем талии у мужчин в среднем равен $107,3 \pm 4,61$ см, у женщин $103,1 \pm 4,81$ см. Коэффициент объема талии к объему бедер у мужчин составил $1,12 \pm 0,06$, у женщин — $1,07 \pm 0,04$. Абдоминальный тип ожирения

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов в исследуемых группах

Показатели	Исследуемые группы			p
	1 группа	2 группа	3 группа	
Возраст, годы	51,12±3,24	52,43±2,06	48,2±3,8	p ₁₋₂ >0,05 p ₁₋₃ >0,05 p ₂₋₃ >0,05
Стаж курения, лет	29,21±5,3	21,86±4,8	0	p ₁₋₂ >0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ <0,05
ИМТ, кг/м ²	32,43±3,12	23,63±2,28	24,94±3,8	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05
SaO ₂	95,27±2,8	96,25±2,8	98,31±1,03	p ₁₋₂ >0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05
Глюкоза крови натощак, ммоль/л	7,11±1,64	5,23±1,81	5,18±1,61	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05
Артериальное давление сист., мм рт.ст.	151,31±3,8	121,27±3,8	117,2±2,8	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,01 p ₂₋₃ >0,05
Артериальное давление диаст., мм рт.ст.	92,23±3,31	65,23±2,67	61,4±1,8	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,01 p ₂₋₃ >0,05
Тест 6-мин. ходьба — 6МШТ, м	346,81±11,8	457,21±13,85	462±14,82	p ₁₋₂ >0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05
Инсулин, мкЕД/мл	16,47±2,18	8,26±1,53	6,82±1,03	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05
ИИР	7,23±1,08	2,4±0,32	2,2±0,71	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05
Эндотелин-1, фмоль/мл	4,81±1,37	2,24±1,64	1,27±0,03	p ₁₋₂ <0,05 p ₁₋₃ <0,05 p ₂₋₃ >0,05

Примечание: p₁₋₂ — уровень значимости различий между 1-й и 2-й группами; p₁₋₃ — уровень значимости различий между 1-й и 3-й группами; p₂₋₃ — уровень значимости различий между 2-й и 3-й группами

I степени диагностирован у 23 пациентов (36,5%), II степени — у 21 (33,3%), III степени — у 19 больных (30,2%). Во 2-ую группу вошли 25 пациентов с изолированным течением ХОБЛ с индексом массы тела (ИМТ) 18,5–24,9 кг/м², сопоставимых с группой исследования по возрастным и функциональным характеристикам. В контрольную (3-ю группу) вошли 19 здоровых добровольцев с нормальными антропометрическими данными. Клиническая характеристика рассматриваемых групп больных представлена в таблице 1. Содержание в сыворотке крови эндотелина-1 определялось методом иммуноферментного анализа с высокой чувствительностью с использованием тест-систем. С помощью расчета индекса инсулинорезистентности (ИИР) по критерию, описывающему степень инсулинорезистентности (The Homeostasis Model Assessment — HOMA) изучали чувствительность

тканей к инсулину [6, 9]. Оценивалось содержание в крови общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ). Интерпретация выраженности симптомов проводилась по модифицированному вопроснику критериев тяжести одышки Британского медицинского совета Medical Research Council Scale (mMRC) и тесту оценки ХОБЛ — COPD Assessment Test (CAT). Переносимость физической нагрузки оценивалась с помощью 6-минутной шаговой пробы. Толерантность к физическим нагрузкам рассчитывалась с помощью теста с 6 минутной ходьбой. Расстояние, пройденное в течение 6 минут измеряли в метрах и сравнивали с должным показателем, рассчитанным по формуле [10]: (2,81 × рост) + (0,79 × возраст) — 28,5. Процент насыщения крови кислородом (SpO₂) опре-

деляли с помощью пульсоксиметра. Рассчитывали индекс курения по формуле: число выкуриваемых сигарет в день \times стаж курения (годы)/20. Изучение гемодинамических показателей сонных артерий проведено методом ультразвукового дуплексного сканирования общих сонных артерий, внутренних сонных артерий и наружных сонных артерий на аппарате «Mindray DC-6». В качестве маркера атеросклеротического процесса определялась толщина комплекса интима-медиа правой и левой общих сонных артерий (КИМ ОСА). Для изучения КИМ общие сонные артерии сканировали в В-режиме с цветным доплеровским определением потока. Нормой считали КИМ $< 0,8$ мм, утолщением — КИМ $\geq 0,8$ мм. Критерием атеросклеротической бляшки считали локальное утолщение КИМ $\geq 1,3$ мм [2, 11]. Для статистической обработки полученного материала использовали параметрические и непараметрические методы. С помощью одновыборочного теста Шапиро-Уилка уточняли, подчиняется ли данная выборка нормальному закону распределения. В том случае, если полученные в ходе обработки статистического материала данные подчинялись указанному тесту, применяли метод параметрического статистического анализа, такой как критерий Стьюдента для сравнения количественных характеристик изучаемых групп. Принимали во внимание уровень значимости (p) $< 0,05$. Метод Пирсона применяли для определения коэффициента корреляции.

Результаты исследования и их обсуждение

Артериальная гипертензия (АГ) I степени выявлена у 11 больных (17,5%), АГ II степени — у 7 больных (11,1%), АГ III степени — у 8 пациентов (12,7%). Отягощенный наследственный анамнез по сахарному диабету выявлен у 18 больных (28,5%). Сахарный диабет 2 типа при дообследовании впервые выявлен у 6 больных (9,5%), нарушенная толерантность к глюкозе — у 10 пациентов (15,9%), нарушенная гликемия натощак диагностирована — у 5 больных (7,9%). Сывороточное содержание общего холестерина в опытной группе составило $6,4 \pm 0,6$ ммоль/л (в контрольной группе — $4,3 \pm 0,7$ ммоль/л, $p < 0,05$). Показатель ТГ был равен $2,6 \pm 0,09$ ммоль/л (в контрольной группе — $1,24 \pm 0,06$ ммоль/л, $p < 0,05$), ЛПНП — $3,2 \pm 0,09$ ммоль/л (в контрольной группе — $2,2 \pm 0,04$ ммоль/л, $p < 0,05$), ЛПВП — $1,71 \pm 0,05$ ммоль/л (в контрольной группе — $1,63 \pm 0,05$ ммоль/л, $p > 0,05$). Индекс атерогенности составил $4,8 \pm 0,12$ (в контрольной группе — $3,38 \pm 0,14$, $p < 0,05$). Индекс курения при ХОБЛ составил $43,5 \pm 19,4$ пачко-лет, при сочетанном течении ХОБЛ — $52,3 \pm 26,5$ пачко-лет. У пациентов с коморбидным течением ХОБЛ наблюдалась большая степень выраженности клинических симптомов основного заболевания по сравнению с больными ХОБЛ без абдоминального ожирения. По данным количественной оценки

степени тяжести одышки по шкале mMRC среднее значение выраженности одышки у больных ХОБЛ составило $1,93 \pm 0,72$ баллов, при коморбидном течении ХОБЛ имело тенденцию к увеличению до $2,65 \pm 0,78$ баллов. Интересно отметить, что при проведении оценочного теста САТ на качество жизни при сочетанном течении ХОБЛ и абдоминального ожирения выявлено достоверное повышение оценочного показателя выше $27,2 \pm 3,74$ баллов (в контрольной группе — $18,6 \pm 2,72$ баллов). При выполнении 6-минутного шагового теста толерантность к физической нагрузке (6МШТ) в группе больных с коморбидным течением ХОБЛ была достоверно ниже, чем в контрольной группе. При коморбидном течении ХОБЛ и абдоминального ожирения выявлено значимое повышение ИИР (таблица 1). Показатель КИМ правой и левой ОСА у пациентов с коморбидным течением ХОБЛ составил соответственно $1,04 \pm 0,02$ мм и $1,12 \pm 0,05$ мм. У 26,5% пациентов 1-й группы выявлено повышение уровня эндотелина — 1, являющегося мощным вазоконстрикторным фактором, по сравнению с 2-й, 3-й группами. Интересно отметить, что при коморбидном течении ХОБЛ выявлено более выраженное повышение показателей индекса резистентности сонных артерий. Так на уровне правой и левой внутренней сонных артерий данный показатель составлял соответственно $0,81 \pm 0,06$ мм и $0,83 \pm 0,08$ мм, на уровне правой и левой наружной сонных артерий данный показатель составлял $0,91 \pm 0,02$ мм и $0,95 \pm 0,03$ мм. Более выраженный показатель толщины комплекса интима-медиа ОСА при наличии АГ при коморбидности ХОБЛ наряду с повышением показателей индекса резистентности сонных артерий можно объяснить воздействием высокого артериального давления на растяжение артериальной стенки с последующим усугублением данного процесса атеросклерозом. При изучении корреляционных взаимоотношений нами выявлены положительные взаимосвязи при коморбидном течении ХОБЛ между индексом инсулинорезистентности и показателем толщины комплекса интима-медиа общих сонных артерий и уровнем ТГ (соответственно, $r = 0,93$; $p < 0,01$ и $r = 0,82$; $p < 0,05$), являющиеся гемодинамическим признаком атеросклеротического поражения сосудов при коморбидности ХОБЛ и абдоминального ожирения.

Выводы

Таким образом, ранняя диагностика гемодинамических нарушений с использованием метода ультразвукового дуплексного сканирования сонных артерий и комплексный подход к коррекции гемодинамических показателей, инсулинорезистентности, метаболических изменений у пациентов с ХОБЛ, ассоциированной с абдоминальным ожирением могут способствовать улучшению функции эндотелия и снижению риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых катастроф при данной коморбидной патологии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Авдеев С. Н. Можно ли улучшить прогноз у больных хронической обструктивной болезнью легких? // Пульмонология. 2015. Т 25. № 4. С. 469–476.
2. Вертинская Н. В. Влияние эндотелиальной дисфункции на гемодинамические изменения в малом круге кровообращения у больных с ХОБЛ // Дальневосточный медицинский журнал. 2008, № 2. С. 11–13.
3. Гайнитдинова В. В., Бакиров А. Б., Ахметзянова Э. Х. Артериальная ригидность периферических сосудов у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и при ее сочетании с артериальной гипертензией // Казанский медицинский журнал. 2013. Т 94, № 6. С. 808–812.
4. Игнатова Г. Л., Антонов В. Н., Родионова О. В. Нарушение функции внешнего дыхания при сочетанном течении хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезни сердца // Consilium Medicum. 2014. Т 16, № 11. С. 28–32.
5. Кароли Н. А., Ребров А. П. Жесткость артерий у больных хронической обструктивной болезнью легких // Терапевтический архив. 2012. Т 84, № 3. С. 12–16.
6. Танченко О. А., Нарышкина С. В., Сивякова О. Н. Урсодеооксиголевая кислота в комплексном лечении больных с метаболическим синдромом // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2012. Т. 22, № 1. С. 82–86.
7. Танченко О. А., Нарышкина С. В., Решетникова Л. К. Особенности иммунного статуса у больных с метаболическим синдромом // Дальневосточный медицинский журнал. 2014, № 2. С. 20–23.
8. Танченко О. А., Нарышкина С. В. Клинические особенности коморбидного течения хронической обструктивной болезни легких и метаболического синдрома // Материалы VII съезда врачей пульмонологов Сибири и дальнего Востока / под общей редакцией академика РАН В. П. Колосова. Благовещенск, 2017. С. 199–202.
9. Танченко О. А., Нарышкина С. В. Клинико-функциональные особенности артериальной ригидности при сочетанной кардиопульмональной патологии // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2018. Выпуск 67. С. 83–92.
10. Чикина С. Ю. Роль теста с 6-минутной ходьбой в ведении больных с бронхолегочными заболеваниями // Практическая пульмонология. 2015. Выпуск 4. — С. 34–38.
11. Hodis H. N., Mask W. J., Labree L. The role of carotid arterial intima-media thickness in predicting clinical coronary events // Annals of Internal Medicine. 1998. Vol. 128. P. 262–269.

© Танченко Ольга Анатольевна (tamaninao@gmail.com), Нарышкина Светлана Владимировна.
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Амурская государственная медицинская академия